

Family Education Sheet

Intususcepción ileocólica



Boston Children's Hospital
Until every child is well

Clinical Education & Informatics
family.ed@childrens.harvard.edu

¿Qué es la intususcepción ileocólica?

- La intususcepción ileocólica ocurre cuando el intestino delgado se repliega en el intestino grueso (consulte la Figura 1).
 - El intestino es el tubo que va desde el estómago hasta el ano y que ayuda a descomponer los alimentos.
- Esto provoca una obstrucción del intestino y su flujo de sangre. Puede dañar al intestino.

¿Cuál es la causa de la intususcepción ileocólica?

En la mayoría de los casos, se desconocen las causas. Parece ocurrir después de que un niño tenga una enfermedad viral. Ocurre con más frecuencia en los meses de mediados de invierno y primavera.

¿Cuáles son los signos y síntomas?

Los síntomas pueden ser:

- Dolor abdominal (de panza) repentino y con retortijones, que mejora rápidamente pero luego regresa
- Ataques de llanto inconsolables (los padres "conocen" este llanto) y el niño recupera su estado normal
- Vómitos
- Distensión abdominal (panza hinchada o abultada)
- Heces (caca) que parecen gelatina roja debido a la sangre

¿Cómo se diagnostica?

La intususcepción casi siempre se diagnostica mediante una ecografía, que toma imágenes de los intestinos de su hijo. La ecografía mostrará imágenes del intestino de su hijo y revelará si el intestino está replegado.

¿Cómo se trata?

Normalmente se puede tratar sin cirugía. Un médico colocará un tubo pequeño en el recto de su hijo y luego introducirá aire a través del tubo para desplegar el intestino. Esto se llama enema por contraste de aire. En algunos casos, podría ser necesaria una cirugía.

¿Puede la intususcepción volver a ocurrir?

Sí. Esto es más probable que ocurra dentro del primer día o 2 días después del tratamiento. Los síntomas de una segunda intususcepción son los mismos que la primera vez. El tratamiento también es el mismo.




Figura 1

Llame si tiene preguntas sobre los síntomas.

Comuníquese con nosotros:

De lunes a viernes, de 8 a. m. a 6 p. m.:

Llame a la línea de la clínica de Enfermería Profesional de Cirugía General: 617-355-7716

Fuera del horario de atención, fines de semana y feriados:

Llame a la línea de Cirugía General al 617-355-7800 y pida hablar con el cirujano general de guardia.

¿Qué pasa después de que mi hijo regresa a casa?

Después de dejar nuestro Departamento de Emergencias, un enfermero profesional lo llamará dentro de las 24 horas para comprobar los síntomas de su hijo. Recibirá otra llamada 3 días después de dejar el hospital. **Si no recibe la llamada, comuníquese con Cirugía General al 617-355-7716.**

¿Cuándo debo llamar al médico?

Llame a la [clínica de cirugía](#) para hablar con un enfermero profesional si su hijo:

- Tiene dolor de panza que está empeorando o que ocurre con más frecuencia
 - Tiene muchos vómitos y/o no puede retener los líquidos
 - No hace mucho pis
 - Tiene fiebre de más de 101.5 °F (38.6 °C)
- Vaya a la [sala de emergencias](#) si su hijo:
- Tiene la panza hinchada
 - Tiene sangre en las heces que no desaparece
 - Está extremadamente cansado y le cuesta despertarse

Siempre puede llamar si tiene cualquier otra pregunta o inquietud (**consulte más arriba**). Si le resulta difícil comunicarse con Cirugía General y está preocupado por su hijo, vaya al departamento de emergencias más cercano para que lo evalúen.

El cirujano de su hijo hoy es:
